

常見流感疫苗接種之 Q&A

Q: 今年疫苗種類:

A: 國光生物科技股份有限公司、荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司、賽諾菲股份有限公司及高端疫苗生物製劑股份有限公司等疫苗廠生產或進口，5 廠牌的疫苗效力與安全性皆符合我國衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經其核准使用/進口，將依照疫苗到貨順序依序提供。

Q: 接種禁忌:

A: 一、已知對疫苗的成分有嚴重過敏者，不予接種。

二、去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

Q: 接種注意事項

A: 一、發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。

二、出生未滿 6 個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。

三、先前接種流感疫苗 6 週內曾發生 Guillain-Barré 症候群 (GBS) 者，宜請醫師評估

四、其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

Q: 接種後注意事項

A: ※發燒反應觀察與處置：接種後 48 小時內約有 1-2% 可能出現發燒反應，就醫時應主動告知醫師接種史；若發*燒超過 48 小時，應警覺是否有其他感染因素。

※異常症狀緊急就醫：如出現持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等嚴重不適，應立即就醫，並同步通報學校師長。

※維持個人防疫衛生：接種疫苗可降低流感感染率，但無法預防其他病毒引起之感冒。建議仍需落實勤洗手、注意個人衛生，以維護身體健康。

※聚集性暈針現象：暈針多發生於青少年集體接種，主因對打針的心理壓力或恐懼轉化為頭暈、噁心等生理症狀，與疫苗安全性無關，亦無後遺症。此類「集體心因性疾病」偶發於大規模接種，若學生返家後症狀持續，請務必儘速送醫診治。

※特定病史加壓止血：若有凝血功能異常或服用抗凝血藥物者，於注射後應在部位加壓至少 2 分鐘，並密切觀察是否有持續性出血或血腫情形。

※ 接種劑次補充說明：貴子女如為出生後首次接種流感疫苗之國小二年級以下學童，可於第一劑接種至少四週後，至醫療院所自費接種第二劑。

Q: 我何時可知道校園流感疫苗施打的廠牌

A: 基於先到貨、先鋪貨、先使用 原則下，各區衛生所於各校校園集中接種前 1 上班日下午 2 時前，將通知該校公費流感疫苗的廠牌。